

| Impfungen gegen | Notwendigkeit | Impfrhythmus |
|------------------------|--|--|
| Cholera | Je nach Reiseland | Nach Angaben des Herstellers |
| Diphtherie | Jede Person ohne ausreichenden Impfschutz | Nichtgeimpfte oder Personen mit fehlendem Impfnachweis sollten 2 Impfungen im Abstand von 4 - 8 Wochen und eine 3. Impfung 6 - 12 Monate nach der 2. Impfung erhalten; Auffrischung nach 10 Jahren |
| FSME | Jede Person, die sich in einem FSME-Risikogebiet* aufhält und Personen, die durch FSME beruflich gefährdet sind | Grundimmunisierung und Auffrischimpfungen nach Angaben des Herstellers (im Regelfall alle 3 - 5 Jahre) |
| Hepatitis A | Personen, die beruflich bedingt einem erhöhten Hepatitis A Risiko ausgesetzt sind (u.a. medizinisches Fach- und Pflegepersonal sowie Küchen- und Reinigungskräfte) je nach Reiseland | Grundimmunisierung und Auffrischimpfungen nach Angaben des Herstellers |
| Hepatitis B | Personen, die beruflich bedingt einem erhöhten Hepatitis B Risiko ausgesetzt sind (u.a. medizinisches Fach- und Pflegepersonal sowie Küchen- und Reinigungskräfte) | Grundimmunisierung und Auffrischimpfungen nach Angaben des Herstellers |
| Influenza | Personen über 60 Jahre, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens wie z. B. chronische Lungen-, Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenkrankheiten, Diabetes und andere Stoffwechselkrankheiten, Immundefizienz, HIV-Infektion. Bei Gefährdung durch Epidemien | Jährliche Impfung, vorzugsweise im Herbst (September - November) mit einem Impfstoff mit aktueller, von der WHO empfohlener Antigenkombination |
| Masern | Alle ungeimpften Personen in Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Kinderheimen u. a. | Zweimalige Impfung |
| Mumps | Alle ungeimpften Personen in Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Kinderheimen u. a. | Zweimalige Impfung |
| Poliomyelitis | Alle ungeimpften Personen | Auffrischung nach dem vollendeten 18. Lebensjahr |
| Röteln | Alle ungeimpften Personen in Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Kinderheimen u.a. | Zweimalige Impfung |
| Tetanus | Alle ungeimpften Personen | Auffrischimpfung in 10jährigen Intervallen |
| Typhus | Bei Reisen in Endemiegebiete | Nach Angaben des Herstellers |